

«Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық бақылау
комитеті» РММ төрағасының
20 ж. «___» _____
№ _____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

**Дәрілік препаратты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық (Қосымша парақ)**

Саудалық атауы

Дормикинд

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі, дозасы

Таблеткалар

Фармакотерапиялық тобы

Басқа да препараттар. Барлық басқа емдік препараттар. Басқа дәрілік препараттар.

АТХ коды V03AX

Қолданылуы

Гомеопатиялық препарат келесі жағдайларда қолданылады:

- емшектегі және мектеп жасына дейінгі балалардағы мазасыздық пен ұйқысыздық жағдайында

Қолдану басталғанға дейінгі қажетті мәліметтер тізбесі

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- белсенді заттардың біріне немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- галактоза жақпаушылығының сирек тұқым қуалайтын бұзылулары

- лопарилер (саамдар) лактаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы

Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары

Препарат құрамында лактоза бар, сондықтан оны қолдануға болмайтын жағдайлар бөлімінде аталған науқастарға тағайындамаған жөн.

Жақсару болмағанда, жай-күй айқынсыздығында немесе жаңа симптомдар пайда болса, дәрігерге қаралыңыз, өйткені бұл жағдайда дәрігерлік көмекті қажет ететін аурулар жайында сөз болуы мүмкін.

Гомеопатиялық дәрілік заттарды қабылдау кезінде бар жағдай уақытша нашарлауы мүмкін (бастапқы гомеопатикалық өршу).

Мұндай жағдайларда пациенттер препаратты қабылдауды тоқтатып, дәрігерге қаралуы тиіс.

Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік препараттармен ешқандай өзара әрекеттесуі айқындалмаған. Осы гомеопатиялық дәрілік препаратты қолдану басқа дәрілік заттарды қолдануды жоққа шығармайды.

Арнайы ескертулер

Гомеопатиялық ем ауруды анықтауға және дәрілік препараттарды қолдануға қатысты дәстүрлі медицинадан айтарлықтай ерекшеленеді.

Гомеопатикалық дәрілер организмнің өзіндік қорғаныс механизмдерін ынталандырады және сонысымен өзін-өзі қалпына келтіру қабілеттілігін белсендіреді.

Организмнің гомеопатиялық дәріге жауап реакциясы өзінше жеке дара. Осыған байланысты нақты дозалар үшін фармакологиялық сипаттамаларды, фармакодинамикалық немесе фармакокинетикалық сипаттамаларды анықтау мүмкін емес.

Гомеопатиялық дәрілік заттарды қабылдау кезінде бар жағдай уақытша нашарлауы мүмкін (бастапқы гомеопатикалық өршу).

Мұндай жағдайларда пациенттер препаратты қабылдауды тоқтатып, дәрігерге қаралуы тиіс.

Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Әсер етпейді

Қолдану бойынша ұсынымдар

Дозалау режимі

Басқа нұсқаулар болмаған кезде Дормикинд былайша қолданылады:

6 жасқа дейінгі балалар: 1 таблеткадан күніне 4 рет.

Емшек еметін балаларды емдегенде таблеткаларды шамамен 20 мл (2 ас қасықпен) қайнаған және суыған суда ерітуге болады.

Енгізу әдісі және жолы

Пероральді

Қабылдау уақыты көрсетілген қолдану жиілігі

Таблеткаларды, олардың ауызда баяу еруіне мүмкіндік бере отырып, тамақтануға дейін жарты сағат бұрын немесе одан кейін жарты сағаттан соң қабылдау керек

Емдеу ұзақтығы

Емдеудің орташа ұзақтығы - 2-4 апта.

Артық дозалану жағдайында қабылдануы қажет шаралар

Артық дозалану жағдайында емдеу симптоматикалық.

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медицина қызметкерінің кеңесіне жүгіну бойынша ұсынымдар

Егер Сіз Дормикинд препаратын қабылдағаннан кейін балаңызда жағымсыз әсерінің белгілері бар деп күдіктенсеңіз, бұл туралы дәрігерге немесе фармацевтке хабарлаңыз.

ДП стандартты қолдану кезінде пайда болатын жағымсыз реакциялардың сипаттамасы және бұл жағдайда қабылдануы тиіс шаралар

- препарат компоненттерінің біріне аллергиялық реакциялар.

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған кезде медицина қызметкеріне, фармацевтика қызметкеріне немесе дәрілік препараттардың тиімсіздігі туралы хабарламаларды қоса алғанда, дәрілік препараттарға жағымсыз реакциялар (әсерлер) бойынша тікелей ақпараттық дерекқорға жүгіну керек

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК
<http://www.ndda.kz>

Қосымша мәліметтер

Дәрілік препараттың құрамы

Бір таблетканың құрамында

<i>белсенді заттар:</i>	Cypripedium pubescens trit. D4	15.00 мг
	Magnesium carbonicum trit. D10	20.00 мг
	Zincum valerianicum trit. D12	15.00 мг,

қосымша заттар: микрокристалды целлюлоза, тальк, лактоза моногидраты, магний стеараты.

Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы

Жалпақ цилиндр пішінді, ойығы бар, ақ немесе ақ дерлік түсті таблеткалар.

Шығарылу түрі және қаптамасы

150 таблеткадан алюминий нығыздағыш дискісі және пластик бұрандалы қақпағы бар қоңыр шыны құтыда. 1 құтыдан медициналық қолдану жөнінде қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Сақтау мерзімі

5 жыл

Контейнер алғаш ашылғаннан кейінгі қолдану кезеңі - 12 ай.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!

Сақтау шарттары

25°C-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Дәріханалардан босатылу шарттары
Рецептсіз.

Өндіруші туралы мәліметтер

Дойче Хомеопати - Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия
Тел. +49 (0) 721 4093 01
Факс +49 (0) 721 4093 8299
E-mail: info@dhu.de

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

Альпен Фарма ГмбХ,
Штайненфельд 3
77736 Цель ам Хармерсбах
Германия
Тел.: +49 (0) 7243 200 49 20
E-mail: info.germany@alpenpharma.com

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттардың сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта)

«Альпен Фарма» ЖШС

Алматы обл., Қарасай ауданы, Елтай ауылдық округі,

Көкөзек ауылы, 1044 құрылыс

Тел. / факс + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

Моб.тел.+7 701 035 70 69 дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты.

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com