

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля»
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан»

от «___» _____ 2021г.
№ _____

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование

Иммунокинд

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Таблетки

Фармакотерапевтическая группа

Прочие препараты. Другие терапевтические препараты все. Другие лекарственные препараты.

Код АТХ V03AX

Показания к применению

- поддержание иммунной системы у детей грудного и младшего возраста при частых и рецидивирующих острых инфекциях дыхательных путей

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к одному из активных веществ или к любому из вспомогательных веществ
- редкие наследственные нарушения переносимости галактозы
- лактазная недостаточность лопарей (саамов) или глюкозо-галактозная мальабсорбция

Необходимые меры предосторожности при применении

При отсутствии улучшения, неясности состояния или появлении новых симптомов обратитесь к врачу, так как в таком случае может идти речь о заболевании, требующем врачебной помощи.

Имеющееся состояние может временно ухудшиться во время приема гомеопатических лекарственных средств (первоначальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациенты должны прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не выявлено никаких взаимодействий с другими лекарственными препаратами. Применение данного гомеопатического лекарственного препарата не исключает применение других лекарственных средств.

Специальные предупреждения

В препарате содержится лактоза, поэтому его не следует назначать больным, перечисленным в разделе противопоказания.

Перед началом применения препарата Иммунокинд родители должны проконсультироваться с врачом, если их ребенок страдает заболеванием щитовидной железы.

Применение в педиатрии

При лечении грудных детей таблетки можно растворять приблизительно в 20 мл (2-е столовые ложки) кипяченой и охлажденной воды.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не применимо

Рекомендации по применению

Режим дозирования

При отсутствии иных указаний Иммунокинд применяют следующим образом:

Дети до 6 лет: по 1 таблетке 3 раза в день.

Метод и путь введения

Перорально

Частота применения с указанием времени приема

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При лечении грудных детей таблетки можно растворять приблизительно в 20 мл (2-е столовые ложки) кипяченой и охлажденной воды.

Длительность лечения

Родители не должны использовать Иммунокинд в течение длительного времени без консультации с врачом.

Средняя продолжительность лечения - 6-8 недель.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Случаи передозировки не выявлены.

В случае передозировки лечение симптоматическое.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Для разъяснения способа применения лекарственного препарата рекомендуется обратиться к медицинскому работнику.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Возможны аллергические реакции к одному из компонентов препарата. При первых признаках побочного эффекта необходимо проинформировать об этом врача или фармацевта.

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов
Информационная база данных по нежелательным реакциям

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

Одна таблетка содержит

активные вещества:

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6	20.00 мг
Calcium fluoratum trit. D6	20.00 мг
Calcium phosphoricum trit. D6	20.00 мг
Sulfur jodatum trit. D12	20.00 мг,

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого или почти белого цвета, с фаской

Форма выпуска и упаковка

По 150 таблеток во флаконе коричневого стекла с алюминиевым уплотнительным диском и пластиковой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Срок хранения

5 лет

Период применения после первого вскрытия контейнера 12 месяцев.

Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

Дойче Хомеопати - Унион ДХУ- Арцнаймиттель ГмбХ& Ко. КГ,

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

Тел./факс +49 (0) 721 4093 01

+49(0) 721 4093 8299

E-mail: info@dhu.de

Держатель регистрационного удостоверения

Альпен Фарма ГмбХ

Штайненфельд 3

77736 Цель ам Хармерсбах

Германия

Тел. +49 (0) 7243 200 49 20

E-mail: info.germany@alpenpharma.com

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Альпен Фарма», Республика Казахстан,

Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ,

с.Кокузек, строение 1044

Тел./факс + 7 727 232-34-73,

+ 7 727 232-34-74

E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com

Моб.тел. +7 701 035 70 69 ответственного за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства.

E-mail: pv.kz@alpenpharma.com